





Early European Books. Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CFMAGL 17-93/a





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CFMAGL 1.7.93/a



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CFMAGL 1.7.93/a




Early European Books. Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CINAGL 1.7.93/a

HENRICI MEIBOMII *Book II*
DE
VASIS PALPE-
BRARVM
NOVIS
EPISTOLA

AD
V. CL.
D. IOELEM LANGELLOTTIVM
Reverendiss. & Sereniss. Ducis Holsatiæ
Archiatrum.



HELMESTADI,
Typis & sumptibus HENNINGI MVLLERI,
ANNO MDCLXVI.





Amplissimo Clarissimoque Viro,
IOELI LANGELLOTTIO D.

Rever. & Seren. Holsatiæ Ducis
Regentis Archiatro

Fautori & Amico suo plurimum
honorando

S. P. D.

HENRICUS MEIBOMIUS

Non diu equidem est, Vir celeberrime,
ex quo inter nos, qui parvo terrarum
spatio sejuncti nunquam tamen nos vi-
dimus, coaluit amicitia: futuram ta-
men eam diuturnam multis de causis
ominari licet. Qui enim aliter possit, quæ pro
fundamento habet virtutem? Eam ego in te su-
spexi semper, ex quo Viros Eruditos suo pretio
æstimare didici, amarique à te laboravi, quan-
quam non erat multum in eo laborandum. Es
enim obvius & expositus plenusque humanitate,
statimque bonam de me meisque studiis conce-
pisti

A 2

pisti opinionem. Crevit autem mox notabili augmento tua erga me benevolentia, simulque tui observantiam in me auxit. Et hæc quidem hætenus mutua fuerunt. Dein autem ea à te in me profecta sunt, quibus paria ut facerem nec meæ res patiebantur nec tuæ. Illud unum mihi reliquum erat, ut & virtutum tuarum, quas jam magis mirabar, quia magis intelligebam, præco apud alios essem, & gratum animum meum frequentioribus litteris testarer, non inanibus tamen illis, sed quæ vel aliunde mecum communicata, vel à me observata in re Medica narrarent. Prius autem me fecisse ab aliis rectius intelliges, posterius non omisisse, tute testis eris. Gratas verò meas quoque tibi fuisse de rebus Anatomicis narrationes non obscuris signis intellexi. Quæ, ut me quidem Anatomen hac in Academia docentem decent, sic ad te minus prudenter mitti, posset putare, qui te minus nosset, aut ex ingenio suo judicaret. Ita enim vulgo hodie fit. Ad primos adolescentiæ annos damnatur structura corporis humani contemplatio, indigna autem censetur, quam vel limis aspiciant, qui medicinam apud ægros faciunt. Notum tibi hominum genus. Fateor equidem, imò hoc effugium ipsis suppedito, si respicias Artem Medicam, tria per Anatomen in sanis corporibus, ut in theatris fieri solet,

let, in
lucul
tulo
aut
prin
pert
rore
vis
med
non
dum
bus
facia
per
quis
que
pere
quæ
tem
rant
sunt
lega
in n
λοο
bus
om
re a

5
let, institutam & disci & doceri, Neccessaria, Utilia,
lucunda. Neccessaria multa occurrere in propa-
tulo est, citra quorum notitiam nemo Medicus
aut Chirurgus feliciter potest operari, qualia im-
primis sunt, quæ ad positum & ordinem partium
pertinent, quæ non satis observata maximos er-
rores pariunt. Sunt dein multa Utilia, quæ quam-
vis Medicum non faciant, aptiorem tamen ad
medendum reddunt. Prima fronte illorum usus
non patet, quæ tamen inde deducuntur, admo-
dum medentem juvant & rationes quoque, qui-
bus in *Φανόμενοις* solvendis & sibi & aliis satis-
faciat, bunde suppeditant. Non quidem igitur
per illa Medicus, sed major fit Medicus, si reli-
quis jungat. Talia multa recentiores nostri-
que seculi Anatomici observarunt, quæ nimis su-
perciliosè, tanquam planè inutilia excludunt, qui
quæ juvenes non didicere, senes satagunt con-
temnere; anatomen autem tam libenter vitupe-
rant, quam eam aggrediuntur inviti. Denique
sunt alia, quæ jucunda nominare placuit, quia e-
legantium ingeniorum delitiæ sunt, etsi aliquem
in medendo usum non habeant. Olim ad *Φι-
λοσόφων παιδας* pertinebant, nec hodie à qui-
busdam illorum negliguntur. Explicarem hæc
omnia latius, adductis exemplis, nisi alibi id age-
re animus esset, & ad te, Vir longe doctissime, scri-
berem,

berem, quem nihil illorum fugit. Nullum autem
est dubium, quin is, qui in Arte nostra rectè ver-
sari vult, illa quæ prioris sunt generis, præ reli-
quis potissimum scrutari & investigare debeat
& tanquam unguis digitosque suos nosse. Ha-
bet enim hîc quoque meritò locum illud Euripi-
dis, citatum ab Aristot. l. 3. Polit. c. 4.

Μή μοι τὰ νόμψ', ἀλλ' ὦν πόλει δέ.

Qui tamen aliquod in arte Medica nomen sibi
acquirere vult, etiam ea, quæ secundi sunt gene-
ris, ignorare non debet. Imò, si ea quoque quæ
tertio loco recensui, diligenter investigarit & ab
alijs liberalibus artibus disciplinisque probè sit
instructus, tum demum in illorum Medicorum or-
dinem pertinet, quos *χάρῃ διατιθεμένους* Hip-
pocrates, *χαρὲντας* appellat Aristoteles. Tales
autem qui fuerint prioribus aut nostro seculo,
non est, ut memorem, cum tu, ὦ *χαρίεσας*, lu-
culentissimum nobis præbeas exemplum. Quàm
enim priora feliciter ad usum Artis didiceris, re-
ferrem, nisi id integræ provinciæ, majore incer-
tum tuo honore, an suo commodo, loquerentur.
Reliqua verò ornamenta, ut cum paucis commu-
nia habes, sic te Magnis Principibus, Immortalis
memoriæ Heroi FRIDERICO & nunc nostri ævi
Musagetæ Incomparabili, CHRISTIANO AL-
BERTO, Domino nostro clementissimo, com-
men-

7
mendarunt, ut suum sibi Archiatrum alter elegerit, alter hodieque carissimum habeat. Non ibo equidem per omnes *χάρις* & tuæ partes, sed tantum illi, de qua capi dicere, humani corporis cognitioni inhærebo. Quod si jam te ea in his rebus Anatomicis scire dixerō, quæ ignorant sæpe illi qui in his consenuerunt, modestiæ forte tuæ injuriam aliquam, veritati certè nullam fecero. Cumque jam non sit tibi semper integrum, sectionibus admove manu, omnem das operam, ne ea te lateant, quæ illi animadvertunt, quibus par tecum studium sciendi & ardor, occasio autem inquirendi commodior. Hæc tua curiositas me ad has quoque litteras dandas invitavit, cum superiori mense iterum virile cadaver ad hos usus nactus essem. Non exspectabis autem ut totius octidui acta tibi referam & ea etiam enarrem à me demonstrata, quæ vel ordinario in corporibus omnibus reperiuntur, vel ab aliis pridem inventa ad nauseam usque descripta sunt (quis enim noctuas Athenas sciens mitteret?) sed tantum, si quæ præter naturam sese obtulerunt, aut si quæ alijs non notata nostra diligentia detexit. Prioris generis, licet pauca, aliqua tamen occurrerunt. Pinguedo enim multis in locis, ubi naturaliter aliàs non comparet, aderat. Id quod cum in obesis corporibus frequenter observarim, non ita attendi: hoc
tamen

tamen non injuria, puto, me suspensum tenuit, aliis
non temerè notatum, quod prope lineam albam,
quam vocamus, inter peritonæum & tendines mu-
sculorum abdominis copiosa pinguedo esset, cum
aliàs illi tendines peritonæo tam arctè soleant con-
nasci, ut vix ulla arte possis separare. In intesti-
no ileo, non longè ab ejus cum crassis connexu,
ἐκφυσίς quædam triangularis comparebat, ali-
quot digitorum longitudine & crassitie, plena ex-
crementis. Quam ut obiter memoro, sic plenius
describam, necesse est, quod in corde observavi,
concrementum lapideum, præsertim, cum qui an-
te hac lapides in corde observarunt, & memoran-
tur plerique à Schenckio *Observ. l. 2.* nimis parce
cum reliquis circumstantias, tum ipsum cordis lo-
cum descripserint. Hoc autem concrementum
hærebat in ventriculo sinistro, eo loco, ubi arteria
magna egreditur, eratque tam firmiter adnatum,
ut sine læsione ipsius arteriosi corporis non pos-
sem liberare. Non habebat autem certam ali-
quam figuram nec æqualem superficiem, videba-
turque quasi ex multis parvis calculis concretum.
Latior ejus pars adhærebat arteriæ emergenti, al-
tera acuta propendebat in cordis cavitatem. An
autem hac de causa vir ille, dum viveret, sympto-
mata quædam passus fuerit, palpitationem aut
tremorem cordis, juxta cum ignarissimis scio. Su-
spicari

Spica
rator
Erast
inter
guinis
petuo
hoc c
cuivis
circit
nulliu
enim
gener
quos
mum
resolv
educ
S
servat
Cum
neren
crym
sed al
tem
serva
quor
ce tu
vafis

spicari idliceret ex iis, quæ de Maximiliano Imperatore à superioris seculi Medicis annotata nosti, Erasto cum primis, Medico doctissimo, consil. 103. inter Cratoniana. Illud ausim asseverare sanguinis ex sinistro ventriculo cordis in arterias impetuosè irruentis motum aliquo saltem modo ab hoc concremento fuisse impeditum. Situs enim cuiusvis hoc faciebat planum. Pendebat hic lapis circiter drachmas duas, duritiei nec maximæ nec nullius, ferè qualis tophorum esse solet. Rarius enim admodum duri lapides in corpore nostro generantur, etsi aliquando id contingat; imò, quos in vesica deprehendimus, calculi ut plurimum tales sunt, quos etiam non magno labore resolvere, & ex ijs cum sale spiritum oleumque educere licet.

Sed missis his, quæ præter naturam mihi observata, ad ea, quæ secundi generis sunt, accedo. Cum enim oculi partes omnes dissectas proponerem, in palpebris ostendi non tantum illa lacrymalia puncta, quæ antehac fuerunt cognita, sed alia quoque, his quidem minora, numero autem plura, quæ ante tres ferè annos primum observavi. Antequam autem ea plenius, ipsosque quorum ostia sunt, ductus describam, paucis, pace tua, recensebo, quid hætenus de palpebrarum vasis in suis scriptis annotarint Anatomici.

B

In

In angulis internis oculorum in utraque palpebra tam superiori quàm inferiori jam tum à veteribus observata fuerunt duo foramina, descripta à Galeno l. x. de usu part. c. xi. sive illum habeant inventorem, sive qui eum antecesserunt, Anatomicos. Vesalius nec in admirando suo opere nec in alijs scriptis horum foraminum facie mentionem, quod forte non injuria mireris, cum etiam post Galenum is, qui ante Vesalium inclauit, Berengarius Carpus comment. in Mundin. p. 467. fatis accuratè ea descripserit. Fallopius autem tanto accuratius de ijs egit & ad nares usque continuavit: imò, cum à Vesalio ea non descripta animadverteret, reliquos quoque Anatomicos ignorasse putavit. Adducam ipsa verba Fallopij ex Observationibus aureis, quia recentioribus ferè omnibus præiuit. *In oculis, inquit, primum prætermisere Anatomici duo foramina parva (quorum unum est in palpebra superiori, alterum in inferiori) in viventibus adhuc hominibus, si quis inspicere voluerit, apparentia. Quæ foramina habent meatus, qui sub caruncula $\epsilon\gamma\kappa\alpha\upsilon\theta\iota\delta$ & vel $\epsilon\pi\iota\kappa\alpha\upsilon\theta\iota\delta$ & dicta uniuntur in quendam communem sinum in nariam cavitatem desinentem per canalem proprium in osse squamoso quod internum angulum occupat, insculptum.* Quæ verba non fatis intellexit, nec ipsos ductus observavit Vesalius, etiam monitus, ut patet ex ipsius Examine Obser-

Obf
cuti
teriu
pend
prat
mina
utrac
seura
culis
Super
minu
Viven
autem
tis ob
aut n
Silen
nonn
cant
rius
quoc
rami
dent
pere
Riola
muta
illa q
more

11
Observationum Fallopij. Fallopium autem se-
cuti Cl. Riolanus in Anthropographia, alii que. Ul-
terius progressus Hieronymus Fabricius ab Aqua-
pendente, accuratissimus, ut nosti, Anatomicus,
præter hæc palpebrarum in interno cantho fora-
mina, alia in externo observavit, unum itidem in
utroque palpebra. Ipsa verba, quia nonnihil ob-
scura & à paucis considerata, recitabo ex l. de o-
culis. part. 1. c. 13. *In utraque extremitate tarsorum
superna scilicet & inferna bina in utroque angulo fora-
minula apparent, tam exigua atque angusta, ut vix in
viventium corporibus aspectabilia sint: in cadaveribus
autem omnino sensum effugiant.* Hanc Aquapenden-
tis observationem qui cum & post eum vixerunt,
aut non attenderunt, aut ei fidem non habuerunt.
Silent enim de illis in externo cantho punctis, imò
nonnulli planè ea negant, & rationes cur illo in
cantho esse non possint, adducunt. Julius Casse-
rius Placentinus, diligentissimus aliàs in minimis
quoque, libro suo de visu de illis in palpebris fo-
raminibus nimis agit parcè, hæc certè, Aquapen-
denti visa, non agnoscit. Nec in Spigeliano o-
pere invenias de his quicquam. Alios enim hic &
Riolanum potissimum, quibusdam retentis, alijs
mutatis sequitur diligens Bucretius. Veslingius
illa quidem in interno cantho puncta eleganter,
more suo, describit, in cantho autem externo ni-
hil

hil videtur observasse, alias vel uno verbo moniturus. Unus Dominicus de Marchettis in illustri Academia Patavina Chirurgiæ Professor, qui hodie cum fratre suo Antonio (ne de patre Petro, jam emerito, quid dicam) secandi peritia inter Italos eminet, post Aquapendentem illa quoque in externo angulo observavit. Sicut, inquit in Anatomæ sua p. 206. *in angulo interno duo observantur puncta lacrymalia, ita in externo summa adhibita diligentia duo foramina inveni satis patentia, quæ eundem ordinem tenent, sicut ea, quæ sunt in angulo interno.*

Post hos longè luculentiorum vasorum in palpebris historiam nobis dedit Nicolaus Stenonis, cujus summam in his rebus peritiam optimè nosti, imò nemo hodie est, qui ignorat. Quamvis autem omnibus accuratius Anatomen tractantibus placeant libelli ab ipso editi, tamen vividum ingenium & *ὀξύνη* singularis, qua ad studia Anatomica fertur, ex familiari conversatione mihi notissima, longè majora ab ipso nos faciunt expectare. Is non tantum ductuum à Fallopio in externo angulo observatorum terminos accuratius descripsit, diversitatemq; in diversis animalibus curiose annotavit, sed præterea quoque nova vasa à glandula oculi innominata prodeuntia primus observavit descripsitque eleganter, quæ inde interiori intra palpebrarum tunicam pergentia exiguis can-

is ea
am
Vir
plur
hos
palp
tatu
plur
liari
te o
latu
traq
quic
cant
peb
divi
exte
bum
one
tem
est, t
inve
exac
trigi
ad u
aute
bus

13
is eandem foraminibus ad brevem à cilijs distantiam pertundunt. Sunt illa omnia sine dubio tibi, Vir clarissime, in recenti memoria, ideoque quæ plura ibidem habet, non describo. Nec præter hos jam memoratos ullus mihi occurrit, qui de palpebrarum vasis quicquam fuerit commentatus. Ego autem in utraque palpebra longe plura observavi ostia, ductuum quorundam peculiarium, exilia tamen admodum, nec prima fronte obvia, quæ causa sine dubio est, cur hæcenus latuerint. Observare autem licet ostia illa in utraque palpebra tam inferiori quam superiori, & quidem in illius partis, quam *ταρσόν* Græci vocant, extrema ora. Quumque extremus ille palpebrarum limbus aliquam habeat latitudinem, divido eum in externam & internam partem. In externa pili sunt: in interna hæc ostia, oculi globum respicientia. Licet hæc citra ullam sectionem intueri. Imo in vivo quoque non poterunt temere illum latere, cui acies oculorum integra est, si locum exactè norit, & fixo lumine palpebras inversas adspiciat. Numerum horum ostiorum exactè definire non possum. Aliquando me ultra triginta numerasse memini. In toto enim limbo, & ad utrumque angulum observantur. Non tenent autem eundem ordinem cum punctis lacrymalibus veterum in interno angulo collocatis, ut cui-

B 3 vis

vis inspicienti patebit, ut sanè nesciam, quæ foramina viderit in externo angulo Marchettus. Hæc à me observata in externo quidem angulo etiam sunt, sed non tenent eundem ordinem cum illis veterum lacrymalibus punctis. Sed fortassis non satis capio, quid per *ordinem eundem tenere* intelligat Vir doctissimus. Transeamus igitur ad ostiorum horum continuationem, videamusque quorum illa vasorum ostia sint. Si invertas tarsos, videbis utrinque corpora glandulosa, ampliora in superiori, quæ si accuratius contempleris & cultellum quoque admoveas, totidem distinctas minimas glandulas observabis, quot in limbo tarsorum sunt ostia. In superiori tarso longiores sunt, nec recta feruntur, in inferiori & rectæ & breviores. Si comprimas has glandulas, humor aliquis prodibit per ostia in limbo memorata, concretus magis in homine dudum mortuo, siquidior in animali recens occiso: certo argumento, esse minimas illas glandulas intus cavas, humoremque, quem continent, per illa ostia effluere. Stylum aut setam aliquam immittere non licet, tanta est plerumque illorum ostiorum angustia. Hæc autem cum ita se habeant, sive velis imposterum glandulas vocare, sive ductus glandulosos, per me licet. Cavitatem enim habent, parietes autem ad glandularum substantiam ac-

am
gin
stat
nec
me,
mini
hum
duli
bile
Qua
corp
sim
que
gland
ipsa
classi
do p
pore
loco
as ex
rum
galli
sunt
quæ
rov
l. 2. h
mine

15
am accedere videntur. Ab alia aliqua parte ori-
ginem suam habere hæc vasa, nondum mihi con-
stat, etsi diligenter inquisiverim. Neque vero
necesse id est. Nosti enim optime, Vir doctissi-
me, non unam eandemque rationem habere om-
nia corporis nostri vasa, quæ ad excernendum
humorem aliquem facta sunt. Quædam in glan-
dulis radicata quidem, extra tamen illas ad nota-
bilem distantiam progrediuntur, ut salivalia vasa,
Quædam in glandulis orta & per glandulosum
corpus dispersa sunt, nec facile extra illud seor-
sim progrediuntur, ut de pancreatico ductu, aliis-
que constat. Quædam denique in tam exilibus
glandulis oriuntur, ut ab ijs separabilia non sint:
ipsæq; adeo glandulæ ductus constituent. Ad hanc
classem pertinent quoque illa in tarsis, quæ mo-
do proposui. Imo dantur ejusmodi alia in cor-
pore nostro, diligenter à me observata, quæ suo
loco & tempore tibi proponam. Quod si cupi-
as exemplum tantum aliquod horum glanduloso-
rum ductuum, inspicias rogo, Vir curiosissime, in
gallina domestica aut alijs pennatis (pauca enim
sunt quæ non habent) œsophagi illam partem,
quæ prope ventriculum dilatatur: Arist. vocat
τὸν πρὸ τῆς γαστρὸς σόμαχον εὐρὺν καὶ πλατύν.
l. 2. hist. an. c. ult. Observabis enim plurimas pro-
minentes papillulas, quæ compressæ humorem
effun-

effundunt. Ubi dein internam tunicam, id quod facile fieri potest, separaveris, videbis multas minimas glandulas, seriatim dispositas & per fibrillas sibi connexas. Singulae autem glandulae aliquem ductum in se continent, seu potius ipsae ductus sunt, qui membranam internam huius dilatati oesophagi perforant & in eius cavitatem succum suum effundunt. Eodem autem modo, ut supra innui, nec hic licet ductus à minimis illis glandulis separare, nec habent illi cum ulla alia parte continuationem. Sufficiat autem unum hoc exemplum illustrandis ductibus nostris: alia ex corpore humano deprompta Observationibus meis Anatomicis, aliquando, Deo volente, edendis, reservabo. Nunc figuram aliquam subijcio palpebrarum dextrarum ab oculo abscissarum, quarum tarsi inversi sunt.

Explicatio figuræ.

- A. *Cutis palpebrarum à capite abscissa.*
- B. *Angulus oculi minor.*
- C. *Angulus oculi major.*
- D. *Palpebræ inferioris tarsus inversus, in quo lineæ ductus, puncta ostia ductuum in limbo denotant.*
- E. *Palpebræ superioris tarsus, in quo similiter lineæ ductus, puncta ostia ductuum denotant.*
- F. *Pili palpebrarum.*
- a. *Puncta lacrymalia antebac cognita.*

Exprimit


quod
s mi-
bril-
e ali-
ipsa
ujus
atem
odo,
illis
alia
num
alia
oni-
nte,
sub-
ciffa-


e du-

e du-

imit

17





19
Exprimit aliquomodo situm horum vasorum hæc
figura, in quibusdam tamen eam imperfectam ef-
se, ut solent pleræque omnes, lubens fateor, nec
tam ad hanc, quam ad descriptionem meam velim
te attendere. In brutis similiter hæ glandulæ cui-
libet obviæ sunt, imò ostia vasorum facilius dete-
guntur, quia nigrore labiorum sese produnt, ut
in alijs etiam vasorum ostiis tum in buccis, tum
sub lingua brutorum contingit. In vitulo, bove,
ove, cane, cervo aliisque observavi, nec dubito,
quin in pluribus quoque reperiantur. Iusta illis
quoque serie in utraque palpebra glandulæ sunt
dispositæ, perque membranam nexæ & quot
glandulæ, tot tubuli, qui callosam palpebrarum
tunicam oculum versus perforant, materiamque
nunc liquidiorē nunc spissiorē continent. Ha-
bes historiam horum vasorum, quorum actionem
Te ipso Vir doctissime, nemo ostendet rectius.
Quid obstat tamen, quo minus & meam sententi-
am tibi edisseram, censuræque tuæ subijciam? Sa-
ne cum omnia hæc vasa, quæ cum alijs, tum mihi
observata sunt, versus oculi globum pateant, ob-
serveturque ille nunc parcius, nunc copiosius hu-
more irrigatus, statim suspicari licet, an per hæc
vasa aut omnis hic humor aut saltem aliqua ejus
pars oculo communicetur. Manifestis enim viis
C ostend-

ostensis, quis ad occultas velit confugere? Certe
nunquam mihi placere potuit illa nonnullorum
de vaporibus elevatis iterumque condensatis do-
ctrina. Sed, sicut inventis hoc seculo ductibus in
os apertis nemo est paullo doctior, qui non consi-
deratis reliquis circumstantiis per eos in os influ-
ere salivarem qui in ore continetur, humorem (ne
dicam, ad oculum ostendi effluxum salivæ ex his
ductibus posse, observante accuratissimo Ruischio
observ. 16.) iudicet: sic quoque per palpebrarum
ductus ad oculum delabi puto has *lacrymationum*
salivas, ut cum Plinio loquar l. xi. c. 37. Verum illud
dubium videtur, annon quædam ex illis vasis ab-
ducant potius humorem, quam adducant. Vide-
mus enim oculi globum naturaliter semper hu-
more aliquo perfusum, nec illum unquam deesse,
unde colligitur semper novum affluere, qui ne ni-
mis abundet, videtur debere abduci. Videmus
quoque humorem illum qui naturaliter ad ocu-
lum irrigandum parcè affluit, quando aut per af-
fectus animi, aut per alias causas concitatus copi-
osius influit, partim quidem extra oculum prola-
bi, partim vero sensim ex ipso oculo subduci. Un-
de suspicari licet, quædam ex his vasis humorem
illum abducere. Examinemus igitur tria illa Vaso-
rum genera, Veterum in angulo interno, Stenoni-
ana &

21
ana à glandula innominata orta, & mea in tarsis fi-
ta, quænam ex his humorem adducant, quænam
abducant. Galenus illa in angulo interno vasa
humorem oculum irrigantem & dare & accipere
voluit: *cum nempe oculi habeant, quod satis est, absor-
bere foraminula hæc, quod superest, tantisper, dum opus
sit*, explicante Hofmanno n. 752. Alij tantum
profluere per illa lacrymas voluere, nulla tamen
adducta ratione. Unus Fallopius ad sensus pro-
vocat, scribitque se in fletibus mulierum observa-
se, majorem partem lacrymarum per hos meatus
ad oculos emanare. Ego tamen cum eruditissi-
mo Stenonio hæc in interno angulo vasa nihil ad-
ducere, sed oculi humorem superfluum exceptum
ad nares deducere puto. Id quod non temere quis
negaverit, si horum vasorum situm, quomodo ab
oculis descendit in narium cavitatem sese ex-
onerent, rectè observaverit. Hæc nimirum via
est, per quam lacrymantibus pueris humor copi-
osius descendens nares quoque ipsas fluere facit.
Hinc est, quod nares emungendo oculos purgare
possimus. Per hæc vasa ocularium medicamen-
torum sapor ad os pervenit, ut forte ipse apud æ-
gros aliquando observasti, memorantque præter
Galenum Carpus in Mundinum p. 467. Thaddæus
Dunus l. 4. de Venæsectione, Vopisc. Fort. Plem-
pius

pius optthalmogr. l. 3. c. 17. fide Adriani Spigelii
& Guilielmi de Mera. Quod Fallopius in mulie-
ribus flentibus se vidisse memorat, id ego nun-
quam potui observare. In angulo quidem inter-
no lacrymalis gutta primum comparet, inde ta-
men non licet colligere, ibi eam ex vasis suis pro-
dure; quia enim ab alijs oculi partibus in declivi-
orem illum angulum confluit humor, ibi primum à
nobis observatur sub lacrymalis guttæ specie.
Nonnulli, quorum sententiam refert Petrus Peti-
tus, eruditus Medicus Parisiensis, l. 1. de lacrymis
c. 13. ulterius progressi etiam inter illos in interno
angulo meatus discrimen aliquod fecerunt. Quæ
enim lacrymæ in dolore, ira aliisque ejusmodi a-
nimi motibus profluunt, per inferioris palpebræ
meatum emitti: quæ autem aliæ profluunt ratio-
ne, quoniam è cerebro, non corde, deriventur,
per superiorem meatum exire dixerunt. Falsitas
verò istius rei statim obvia est. Ne enim alia nunc
adducam, cum isti duo meatus mox in unum trun-
cum coeant, qui ad nares pergit, qui poterunt per
hunc aliæ, per illum aliæ lacrymæ profluere. Ber-
engarius Carpus fibras his ductibus ascribit. Re-
citabo ipsa verba ex ejus in Mundinum commen-
tario p. 467. quia in paucorum manibus liber ille
est. *Et credo, quod intra talia foramina sint villi omni-*

um mo-

23
um modorum, qui faciunt ad expulsionem & retentio-
nem naturalem lacrymarum. Et ideo si contingat Chi-
rurgum incidere tales villos, ut saepe fit in exituris tali-
um locorum, continuè fluunt lacrymæ, quia villi prædi-
cti incisi non possunt retinere, quod retinebant, & ita et-
iam sæpissime contingit hic error in cauterisando fistu-
las lacrymales. Verum isti quidem villi, siue fibræ,
finguntur tantum, non revera sunt, quod autem
ductibus illis læsis lacrymæ effluant, mirum non
est, cum per adducentes humor ad oculum con-
tinuo fluat, per hos autem læsos abduci non pos-
sit ideoque lacrymarum forma effluat. Verum
expectas forte, ut illis abducentibus missis, reli-
quorum in palpebris vasorum actionem propo-
nam. Stenoniana vasa inter adducentia ab In-
ventore collocata sunt, idque maximo jure. Ad
eandem verò classem mea quoque pertinent: per
quæ, ut & per Stenoniana, humiditas illa addu-
citur, quæ palpebras inter & oculi globum erat
necessaria, cum illæ continuo moveri deberent
& celerrimè, id quod citra humorem aliquem in-
tercedentem fieri non poterat. Ille autem ali-
quando aut per motus animi aut aliis de causis,
copiosius influit per hæc vasa dumque statim in
abductoria recipi non potest, extra oculum in ge-
nas prolabitur, vocaturque lacryma. Hinc est il-

la, quam in lacrymantibus observamus, palpebra-
rum intumescencia. Hinc videmus eos, quibus
lacrymas fingere lubido est, utramque palpebram
valde comprimere; sic enim statim oculi globus co-
piosiorem humorem, ex his ductibus in tarsis expresso,
ipsis perfunditur. Imò per fit verosimile, in præ-
ternaturali statu viscidum illum humorem, qui pal-
pebras nocturno tempore conglutinare solet, ex
his ductibus prodire. Si in cadavere humorem, qui
ex his ductibus, concretus plerumque, exprimitur,
contempleris admodum similis est lemni illis, quæ
in oculorum angulis colliguntur, id quod ad me-
am quoque sententiam roborandam non parum
facit. In brutis, uti hi ductus etiam adsunt, sic e-
undem habent usum, ut nempe oculum inter &
palpebras humorem suppeditent illis movendis &
ne cornea exsicceetur. In illis vero animalibus ali-
quando etiam copiosius effluere, etsi non per affe-
ctus animi motum, certum est, qui cur lacrymæ no-
mine indignus sit, non video. Sæpe his diebus,
infecto in animalium oculos acerrimo pulvere, ut
humoris, ex quibus prædiceret locis, motum obser-
varem, magna copia profluere lacrymam vidi. A-
lia, quæ circa hanc materiam notare possem, lubens
prætermitto, cum sciam ista omnia Tibi, Vir erudi-
tissimè, patere, si modo velis cogitationes duas co-
dimit-

25
dimittere. Cum autem præter hæc vasa palpebra-
rum propriæ observationis nihil ultima in Anatome
ostenderim, adeoque materia propositæ scriptio-
nis me deficiat, Epistolam claudō, hac tamen addita pro-
missione, alio tempore me & plura & doctiora allatu-
rum. Cum enim Serenissimi Principes studiis meis
Anatomicis, suppeditatis abunde subsidiis, fave-
ant: cum discantium numerus indies auctior me ex-
citet, cur non ausim aliquid de industria mea, hoc
præsertim ætatis meæ vigore, tibi polliceri? Quod
si tui similitumque eruditissimorum hominum favor
acceserit & benevolentia, tum demum aliquod me
operæ prætium fecisse judicabo. Vale. Scripsi in
Academia Iulia, quæ est Helmæstadij. vi. Calend.
Iun. A. M D C LXVI.



